



Vacunación



¿QUÉ ES UNA VACUNA?

Una vacuna es una sustancia que al ser administrada a una persona, produce en ella defensas contra enfermedades específicas.

Esquema Obligatorio de Vacunación

En Colombia es obligatorio colocar las siguientes vacunas a los niños.

B.C.G.

Protege contra la **Tuberculosis**. Se aplica una sola dosis en el hombro izquierdo del bebé cuando pesa más de 2000 grs.

D.P.T.

La vacuna contra **Difteria, tétanos, tos ferina** se aplica a los 2-4-6 meses de vida con refuerzo a los 18 meses y 5 años.

Antipolio

Protege contra la **Poliomielitis o Parálisis Infantil**, que se aplica a los 2-4 y 6 meses de vida. Los refuerzos son a los 18 meses y 5 años.

Antihaemophilus Influenza Tipo B

Protege contra varias enfermedades entre ellas la **Meningitis**. Se aplica a los 2-4-6 meses de vida.

Vacuna Pentaxim

Contiene 3 vacunas para disminuir efectos secundarios, ya que es una vacuna especial para los niños prematuros y contiene: **DPat, Polio y Haemophilus** que se aplica a los 2-4-6 meses de vida.

Hepatitis B

Protege contra **Hepatitis B**. Son tres dosis a los 2-4-6 meses de vida.

MMR

Protege contra: **Sarampión, Rubéola y Paperas**. Se aplica al año de vida, con refuerzo a los 5 años.

Fiebre Amarilla

Protege contra la **Fiebre Amarilla**. Se aplica al año de vida con refuerzos cada 10 años.

ESQUEMA COMPLEMENTARIO DE VACUNACIÓN

Neumococo

Protege contra infecciones muy fuertes causadas por **Neumococo**. Son 4 dosis de la vacuna así: 2-4-6 meses con refuerzo entre los 12 y 18 meses de vida.

Rotavirus

Vacuna oral contra el **Rotavirus**. Son 2 dosis a los 2 y 4 meses de vida.

Varicela

Una sola dosis después del primer año de vida.

Hepatitis A


Son 2 dosis a partir del primer año con diferencia de 6 meses cada una.

Esquema de Vacunación y Cuidados Después de Vacunar a su Hijo

Vacuna	# de Dosis	Edad de Aplicación	Cuidados
BCG	1	R.N. ó >2000 gr. de peso	Ninguno
PENTAXIM (DPat, Polio + haemophilus)	3	2-4-6 Meses Refuerzo 18 M y 5 años	Paños de Agua Fría
Hepatitis B	3	2-4-6 Meses	Paños de Agua Fría
Neumococo	4	2-4-6 - 12 y 18 Meses	Paños de Agua Fría
Rotavirus	2	2 Y 4 Meses	No
MMR	1	1 Año Refuerzo a los 5 Años	No
Fiebre Amarilla	1	1 Año Refuerzo cada 10 Años	No
Varicela	1	1 Año	No
Hepatitis A	2	1 Año y luego 6 meses después	No

Recuerde, sí es necesario dar algún medicamento luego de vacunar a su hijo, su médico se lo ordenará

Papás Recuerden



**Es su Obligación
Aplicar las vacunas
a su bebé**

**Las Vacunas
Salvan la vida
de su hijo!!**

Cuide el carnet de vacunación.

Actualización: Elizabeth Gómez
Marta Paredes
Enfermeras PMCI